


自行注射Ovidrel®的简单步骤



仅用于说明目的。

自信心非常重要

自2001年以来，Ovidrel®一直都是希望能为人父母的患者所使用的促排卵针，用户人数已超过350万人。

适应症

Ovidrel®预填充注射器(绒毛膜促性腺激素注射器)的用途是什么?

Ovidrel®预填充注射器(绒毛膜促性腺激素注射器)的用途是最终让卵成熟，以便准备取卵。使用Ovidrel®的女性都经历过垂体脱敏作用且经过促卵泡激素(FSH)的适当预处理，这是辅助生殖技术(ART)计划的一部分，例如体外受精(IVF)和胚胎移植。

Ovidrel®预填充注射器也适用于刺激排卵(OI)和帮助无法排卵之不孕患者怀孕，这些患者属于功能性不孕，而非由于原发性卵巢衰竭。

重要的风险信息

哪些人不宜使用Ovidrel®预填充注射器?

Ovidrel®预填充注射器不宜用于具有下列情况的患者：

- 对hCG或药物中的任何其他成分有过敏反应
- 原发性卵巢衰竭(卵巢无法再排卵)
- 未获控制的甲状腺或肾上腺疾病
- 脑癌，例如垂体腺瘤
- 有过子宫或阴道异常出血的纪录
- 卵巢肿胀、变大或疼痛
- 性器官癌症
- 孕妇

如何使用Ovidrel®

应将Ovidrel®注射到下腹部，距离肚脐至少一英寸的位置。始终依照医嘱注射药物。

请仔细阅读以下说明。

准备： 在开始之前



在使用前大约30分钟，从冰箱取出您的药物。



将所需的任何物品放在干净、平坦的表面上：

- 一支Ovidrel®预填充注射器
- 两个酒精拭子
- 一个锐器容器



使用肥皂和清水洗净双手，然后使用酒精棉片擦拭注射部位的皮肤。

Ovidrel®预填充注射器仅供单次皮下注射使用。应丢弃任何未使用的材料。

开始使用Ovidrel®之前，请向您的医疗照护专业人士告知您所有的医疗状况。向您的医疗照护提供者说明您服用的所有药物，包括处方药、非处方药、维生素和草本补品。

我们鼓励您向FDA报告处方药的不良反应。请访问 www.fda.gov/medwatch 或致电1-800-FDA-1088。或致电1-800-283-8088与EMD Serono 联系。

请参阅接续第2页的“重要风险信息”和随附的“完整处方信息”。

步骤1: 准备注射器和您的注射部位




小心地将注射器的盖子取下。
请勿触摸针头或使其接触任何表面。



将针头正面朝上摆放，轻轻敲击注射器，直到所有气泡浮到顶端。



慢慢压下活塞，直到一小滴液体出现在针头顶端。




在腹部选择一个注射部位。使用酒精拭子清洁所选部位的皮肤。

步骤2: 注射您的药物



用一只手捏起注射部位周围之前清洁过的皮肤。



以大约45°到90°的向上角度，将整个针头完全插入皮肤中，然后放开捏起的皮肤。



缓慢按下活塞，直到所有药物注射完毕。



抽出针头并将注射器丢弃到锐器容器中。
请参阅常见问题解答，了解如何安全处置使用过的针头、药瓶和注射器。

常见问题解答

我要如何适当处置Ovidrel®注射器?

注射器应在使用后立即弃置在FDA批准的锐器处置容器中。如果您没有锐器容器，**请勿将松脱的针头和药瓶丢弃在家用垃圾桶中。相反，您应使用符合下列条件的容器：**

- 使用重型塑料制成
- 可通过贴合、耐穿刺盖子盖紧
- 使用期间可保持直立和稳定
- 防漏
- 适当标示以警告容器内含危险废弃物。

了解更多信息，请访问
www.fda.gov/safesharpsdisposal。

如果在炎热或寒冷的天气期间，我将药物放在车中，这样还能使用药物吗?

Ovidrel®必须远离光线照射。将预填充注射器存放在温度介于36°F至46°F的冰箱中，以便在纸盒上显示的到期日之前使用。如果以室温（不超过77°F）存放，必须在30天后丢弃Ovidrel®预填充注射器。

重要风险信息 (续)

在开始使用Ovidrel之前，应了解哪些最重要的信息?

- 接受FSH和hCG处理的患者可能出现轻度至中度的单纯型卵巢增大现象，并伴有腹部膨胀和/或腹部疼痛的情形。
- 卵巢过度刺激综合征 (OHSS) 可能从单纯型卵巢增大迅速恶化，而变成严重的医疗事件。OHSS的早期症状包括严重的骨盆疼痛、恶心、呕吐和体重增加。如果您认为自己可能有OHSS的症状，请立即与您的医生联系。
- 接受Ovidrel®疗法可能导致多胎妊娠。
- 接受Ovidrel®疗法可能造成血凝块。
- 此药物是否存在于人乳中尚不得而知。因为许多药物都可通过人乳排出体外。如果您正在哺乳，请立即告知您的医生。

Ovidrel®预填充注射器的最常见副作用是什么?

使用Ovidrel®预填充注射器的女性最常见副作用包括腹部疼痛、恶心和呕吐。针头注射可能造成某些不适。

以上并非Ovidrel®所有可能的副作用。了解更多信息，请参阅产品标签并咨询您的医疗照护提供者或药剂师。

请与您的医疗照护提供者联系，了解关于副作用的医疗建议。您可以致电1-800-FDA-1088向FDA报告副作用。

请参阅随附于本撕纸垫和产品纸盒中的“完整处方说明”和Ovidrel®患者教育，或访问EMDSeronoFertility.com

更多支持

扫描二维码以观看Ovidrel® (绒毛膜促性腺激素预填充注射器) 的注射影片

更多支持材料，请访问

EMDSeronoFertility.com。