

Ganirelix Acetate Injection

Ganirelix
Acetate
Injection
250 mcg/0.5 mL

使用说明

关于Ganirelix Acetate Injection的重要信息

使用 Ganirelix Acetate Injection 必须谨遵医嘱。

在未收到医疗服务人员的给药说明前, 请勿注射 Ganirelix Acetate Injection。

医疗服务人员的密切护理是至关重要的。

请勿将 Ganirelix Acetate Injection 和任何其他药物混装在同一注射器中。

使用前须知

Ganirelix Acetate Injection 封装在无菌、预填充注射器中提供, 且应仅采用皮下(在皮肤下)注射的方式使用。在使用 Ganirelix Acetate Injection 之前, 请仔细阅读所有说明。

您将需要使用

- ✓ Ganirelix Acetate Injection 预填充注射器
- ✓ 含消毒剂的棉签
- ✓ 供丢弃医疗垃圾的安全容器

用肥皂和清水彻底洗手。



该说明书提供了补充性内容, 但不可替代医疗服务人员有关 Ganirelix Acetate Injection 的具体用法说明。只有在收到医疗服务人员的指示后才可使用。

请阅读附随的 Ganirelix Acetate Injection 的处方信息, 并与您的医生进行讨论。

使用您的

Ganirelix Acetate Injection

Ganirelix
Acetate
Injection
250 mcg/0.5 mL

准备 ▶ 选择您的注射部位并做好准备



最方便的注射部位是腹部的肚脐周围或大腿上部。用含消毒剂的棉签擦拭注射点周围约 2 英寸的皮肤。至少要等 1 分钟，让消毒剂晾干。

每次注射时稍微变动一下注射部位。

设置 ▶ 开启注射器



将注射器朝上，然后拔掉针头护帽。

请勿触碰针头，且勿将未套护帽的针头置于任何表面上。

注射 ▶ 注射 Ganirelix Acetate Injection



用大拇指和其他手指捏起一大片皮肤。

将针头插入捏起的皮肤底部，针头和皮肤表面呈 45° 至 90° 的角度。

将注射塞轻轻向后拉。

如果针头已正确插入，则将注射塞向后拉时会吃力。



如果轻轻向后拉注射塞之后，您发现注射器中有血液，则说明针尖刺到了静脉或动脉。

如果发生了这种情况，请把针头稍微拔出一点并重新插入正确的部位（请勿将针头从皮肤中拔出）。或者，也可以拔出针头并用含消毒剂的棉签压住注射部位。出血将在 1 或 2 分钟之内止住。立即丢弃原来的针头和注射器。使用新的无菌、预填充注射器，重复注射步骤。

一旦针头正确插入，请缓慢且稳稳地按压注射塞，直到注射器中的注射液全部注入体内。



快速拔出针头，然后用含消毒剂的棉签压住注射部位。

按照医疗服务人员的指示处理针头和注射器。请勿重复使用。

请阅读随附的Ganirelix Acetate Injection的处方信息，并与您的医生进行讨论。